



EML 2022

Filière ECE

Exercice 1 (Enoncé)

Exercice 1

Dans tout l'exercice, p désigne un réel de $]0, 1[$ et on pose $q = 1 - p$.

Toutes les variables aléatoires considérées dans cet exercice sont supposées définies sur un même espace probabilisé noté $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.

On considère en particulier une variable aléatoire X à valeurs dans \mathbb{N} , dont la loi est donnée par :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \mathbb{P}(X = k) = q^k p = (1 - p)^k p$$

Partie A

1. Montrer que la variable aléatoire $Y = X + 1$ suit une loi géométrique dont on précisera le paramètre.
2. En déduire que X admet une espérance et une variance, et préciser $\mathbb{E}(X)$ et $\mathbb{V}(X)$.
3. Au début d'un programme Python, on suppose avoir saisi la commande suivante :

```
import numpy.random as rd
```

Compléter la fonction Python suivante afin que, prenant en entrée le réel p , elle renvoie une simulation de la variable aléatoire X .

```
def simule_X(p):  
    Y=.....  
    while .....:  
        Y=Y+1  
    return Y-1
```

Partie B

Un casino a conçu une nouvelle machine à sous dont le fonctionnement est le suivant :

- le joueur introduit un nombre k de jetons de son choix ($k \in \mathbb{N}$), puis il appuie sur un bouton pour activer la machine ;
- si k est égal à zéro, alors la machine ne reverse aucun jeton au joueur ;
- si k est un entier supérieur ou égal à 1, alors la machine définit k variables aléatoires X_1, \dots, X_k , toutes indépendantes et de même loi que la variable aléatoire X étudiée dans la partie A, et reverse au joueur $X_1 + \dots + X_k$ jetons ;
- les fonctionnements de la machine à chaque activation sont indépendants les uns des autres et ne dépendent que du nombre de jetons introduits.

Le casino s'interroge sur la valeur à donner à p pour que la machine soit attractive pour le joueur, tout en étant rentable. Le casino imagine alors le cas d'un joueur invétéré qui, avant chaque activation, place l'intégralité de ses jetons dans la machine, et continue de jouer encore et encore.

On note, pour tout n appartenant à \mathbb{N} , Z_n la variable aléatoire égale au nombre de jetons dont dispose le joueur après n activations de la machine. On suppose que le joueur commence avec un seul jeton ; ainsi $Z_0 = 1$.

On remarque en particulier que Z_1 suit la même loi que X .

4. En utilisant la fonction `simule_X`, compléter la fonction Python suivante afin que, prenant en entrée un entier n de \mathbb{N} et le réel p , elle simule l'expérience aléatoire et renvoie la valeur de Z_n .

```
def simule_Z(n,p):
    Z=1
    for i in range(1,n+1):
        s=0
        for j in range(1,Z+1):
            .....
        Z=.....
    return Z
```

5. Pour tout n appartenant à \mathbb{N} , on note u_n la probabilité que le joueur n'ait plus de jeton après n activations de la machine ; ainsi on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \mathbb{P}(Z_n = 0)$$

On note également R l'événement : « le joueur finit par ne plus avoir de jeton ».

- a) Préciser les valeurs de u_0 et de u_1 .
 b) Comparer, pour tout n appartenant à \mathbb{N} , les événements $[Z_n = 0]$ et $[Z_{n+1} = 0]$ puis en déduire que la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est monotone et convergente.

Dans la suite de l'exercice, on note $\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

6. Justifier que : $\mathbb{P}(R) = \ell$.
 7. a) Montrer que, pour tout k appartenant à \mathbb{N} , on a :

$$\mathbb{P}_{[Z_1=k]}(Z_2 = 0) = (u_1)^k$$

On admet que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall k \in \mathbb{N}, \mathbb{P}_{[Z_1=k]}(Z_{n+1} = 0) = (u_n)^k$$

- b) En déduire :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sum_{k=0}^{+\infty} \mathbb{P}(Z_1 = k) (u_n)^k = \frac{p}{1 - qu_n}$$

8. a) Montrer que ℓ vérifie :

$$(\ell - 1)(q\ell - p) = 0$$

- b) On suppose $p \geq \frac{1}{2}$. Montrer que : $\mathbb{P}(R) = 1$.
 c) On suppose $p < \frac{1}{2}$. Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n \in \left[0, \frac{p}{q}\right]$$

En déduire : $\mathbb{P}(R) < 1$.

- d) Expliquer pourquoi le casino préférera choisir p dans l'intervalle $[\frac{1}{2}, 1]$.

Partie C

On suppose à présent que $p \geq \frac{1}{2}$. Le casino cherche la valeur à donner à p pour que le joueur joue le plus longtemps possible dans le casino et ainsi dépense plus d'argent dans ses consommations au bar. On note T la variable aléatoire égale au nombre d'activations de la machine effectuées par le joueur lorsque, pour la première fois, celui-ci n'a plus de jeton.

On pose, pour tout n de \mathbb{N} , $v_n = 1 - u_n$.

9. Justifier que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \mathbb{P}(T \leq n)$$

puis que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(T = n) = v_{n-1} - v_n$$

10. Montrer, pour tout $N \in \mathbb{N}^*$:

$$\sum_{n=1}^N n \mathbb{P}(T = n) = \sum_{n=0}^{N-1} v_n - N v_N$$

11. On suppose dans cette question que $p = \frac{1}{2}$.

a) Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{n}{n+1}$$

b) En déduire que la variable aléatoire T n'admet pas d'espérance.

12. On suppose maintenant que $p > \frac{1}{2}$ et on pose :

$$\forall n \in \mathbb{N}, w_n = \frac{1 - u_n}{\frac{p}{q} - u_n}$$

a) Montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, w_{n+1} = \frac{q}{p} w_n$$

b) En déduire que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^n}{1 - \left(\frac{q}{p}\right)^{n+1}}$$

puis que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, 0 \leq v_n \leq \left(\frac{q}{p}\right)^n$$

c) Montrer que la variable aléatoire T admet une espérance et que l'on a :

$$\mathbb{E}(T) \leq \frac{1}{1 - \frac{q}{p}}$$

13. Quelle(s) valeur(s) de p recommanderiez-vous au casino ?